

سال تحصیلی ۹۸-۹۹

## برنام آنکه جان را فرست آموزت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  
معاونت آموزشی

دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی  
مرکز سنجش آموزش پزشکی

سال تحصیلی ۹۸-۹۹

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد

### رشته

# مجموعه مامایی

دورس امتحانی و ضرایب مربوطه									رشته امتحانی	
زبان عمومی	(و اینزشکی در معاشری)	و اخلاقات جنسی	پیاده های دادنی و براحتی	مزبوطه به مامایی	بنیان شناسی	نوزادان و مردگان	مزبوطه	تمدداشت، قفسه های خانواده	کودک و تنظیم خانواده	بارداری و زایمان و نیماری های زنان
۲	۰	۱	۱	۲	۲	۲	۴			مامایی
۲	۲	۰	۰	۲	۳	۳			مشاوره در مامایی	

تعداد سوالات: ۱۶۰ سوال

مشخصات داوطلب:

زمان پاسخگویی: ۱۶۰ دقیقه

نام و نام خانوادگی:

تعداد صفحات: ۱۹ صفحه

شماره کارت:

### داوطلب عزیز

خواهشمند است قبل از شروع پاسخگویی، دفترچه سوالات را از نظر تعداد صفحات به دقیقت مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود هر گونه اشکال به مسئولان جلسه اطلاع دهید.

استفاده از ماشین حساب مجاز نمی باشد.

**بارداری و زایمان و بیماری‌های زنان**

**۱ - کدامیک از موارد زیر در مورد لیبر صحیح است؟**

- الف) در تعریف جدید ACOG لیبر فعال در دیلاتاسیون ۶ سانتی‌متری آغاز می‌شود.
- ب) مرحله نهفته طول کشیده در زنان نولی پار در حدود ۱۴ ساعت است.
- ج) چاقی مادر، مراحل اولیه لیبر را ۱ تا ۲ ساعت طولانی تر می‌کند.
- د) ترس مادر ۱۵ تا ۴۵ دقیقه طول لیبر را کاهش می‌دهد.

**۲ - کدامیک از جملات زیر در خصوص مراقبت‌های دندانپزشکی در بارداری صحیح است؟**

- الف) درمان بیماری پریودنتال در بارداری از بروز زایمان پره ترم جلوگیری می‌کند.
- ب) بارداری کنتراندیکاسیون درمان‌های دندانپزشکی است.
- ج) حاملگی سبب تشدید پوسیدگی دندان می‌شود.
- د) رادیوگرافی دندان در بارداری کنتراندیکه نیست.

**۳ - خانمی دچار گسیختگی اپیزیاتومی شده است. همه موارد در پروتکل قبل از عمل برای ترمیم صحیح است، بجز:**

- الف) دبیریدمان بافت نکروتیک
- ب) شستشوی زخم با بتادین
- ج) بستن زخم به محض بروز تب
- د) آنالژزی یا بی‌حسی کافی

**۴ - خانمی در شروع لیبر فعال دارای جنینی با قرار عرضی است، کدامیک از تدابیر درمانی زیر صحیح است؟**

- الف) معمولاً اندیکاسیونی برای زایمان سزارین است.
- ب) در صورت پاره شدن پرده‌ها، چرخش خارجی انجام می‌شود.
- ج) برای انجام سزارین انسزیون عرضی تحتانی ارجح است.
- د) با اعمال فشار بر فوندوس، سر جنین به سمت پایین هدایت می‌شود.

**۵ - بر اساس ACOG، آمنیوانفوزیون در کدامیک از موارد زیر توصیه نمی‌شود؟**

- الف) درمان افت‌های متغیر
- ب) پارگی طولانی مدت پرده‌ها
- ج) ابتلا به الیگو هیدرآمنیوس
- د) رقیق کردن مایع آمنیون آغشته به مکونیوم

**۶ - برای خارج‌سازی بريچ ناکامل، کدامیک از موارد زیر صحیح است؟**

- الف) اپیزیاتومی لترال ارجح است.
- ب) پس از خروج اندام تحتانی، عامل زایمان لگن جنین را با دو دست می‌گیرد و کشش رو به پایین می‌دهد.
- ج) برای خارج کردن بازوی گردنی راست، بدن جنین در جهت عقربه‌های ساعت چرخانده می‌شود.
- د) با مانور زاویلی پشت جنین به سمت سمفیز پوبیس چرخانده می‌شود.

**۷ - در جریان حاملگی، مسئول هیپرلیپیدمی مادر کدامیک از موارد زیر می‌باشد؟**

- الف) افزایش مقاومت به انسولین
- ب) تحریک پروژسترونی
- ج) کاهش فعالیت لیپولیتیک
- د) افزایش فعالیت لیپاز

**۸ - با مصرف روزانه چند میکروگرم اسید فولیک قبل از حاملگی می‌توان نقايسن لوله عصبی را کاهش داد؟**

- |   |        |        |          |
|---|--------|--------|----------|
| ۵ | ج) ۶۰۰ | ب) ۴۰۰ | الف) ۲۰۰ |
|---|--------|--------|----------|

- ۹- قسمت اعظم افزایش وزن در دوران حاملگی مربوط به موارد ذیل است، بجز:

- ب) مایع خارج عروقی خارج سلولی
  - ج) رحم و محتویات آن
  - د) تغییرات متابولیک

۱۰- کدامیک از مراقبت‌های زیر برای زنان ۳۸ هفته مبتلا به IUFD توصیه می‌شود؟

- (الف) آنالیز ریز آرایه‌ای کروموزومی (CMA)

(ب) جدا کردن فوری نوزاد مرده از مادر

(ج) القای الکتیو لیبر در هفته ۴۰ در حاملگی

(د) مصرف روزانه ویتامین E و C در حاملگی

- ۱۱- کدامیک از موارد زیر در مورد مراقبت‌های دوره نفاسی صحیح است؟

- الف) در دو ساعت اول، فشار خون و نبض هر نیم ساعت بررسی شود.  
 ب) گر گرفتگی شبانه به دنبال عفونت نفاسی شایع است.

ج) در صورت بروز پروسیدنシیای نفاسی، کارگذاری پساري مناسب الزامی است.

- ۵) اکثر آسیب‌های عضلانی با داروهای ضد التهابی و درمان فیزیکی برطرف شود.

۱۲- پیگیری STD در افراد تحت خشونت جنسی که درمان پروفیلاکسی دریافت کرده‌اند، چگونه است؟

- الف) تکرار آزمایشات STD و بارداری ۲ هفته بعد و پیگیری تا ۲۴ هفته بعد از تجاوز  
ب) درخواست آزمایشات STD یک ماه بعد و پیگیری تا ۱۲ هفته بعد از تجاوز  
ج) تکرار آزمایشات STD و بارداری ۶ هفته بعد و پیگیری ۲۴ هفته بعد از تجاوز  
د) درخواست آزمایشات STD سه ماه بعد و پیگیری یک سال بعد از تجاوز

۱۳- همه گزینه‌ها در تشخیص و درمان وستیبولودینیای برانگیخته (PVD) صحیح است، بجز:

- الف) وجود حساس شدگی سیستم عصبی مرکزی و محیطی
  - ب) احساس درد و سوزش در تماس با ناحیه وستیبول
  - ج) تجویز استروپید به عنوان خط اول درمان
  - د) درمان روان‌شناختی به عنوان خط اول درمان

۱۴- میزان نیاز توصیه شده در کدامیک از مواد معدنی در دوران شیردهی کمتر از بارداری است؟

- الف) کلسیم      ب) سدیم      ج) آهن      د) روی

۱۵- کلیه واکسن‌های ساخته شده از ویروس زنده در بارداری ممنوع است، بجز:

- الف) سرخک      ب) اوریون      ج) تب زرد      د) آبله

۱۶- کدام گزینه درباره ویژگی سندرم تحریک بیش از حد تخدمان OHSS صحیح است؟

- الف) بروز آسیت سفت و هیدروتوراکس در OHSS با درجه ۶  
ب) بروز تغليظ خون و اختلال انعقادی در OHSS با درجه ۵  
ج) افت جدی آنزیمهای کبدی و افزایش فشار خون  
د) بزرگ شدن دو طرفه و شکنندگی تخدمانها

۱۷- در رابطه با عفونت‌های تناسلی زنان، کدام گزینه صحیح است؟

- الف) آبسه لوله‌ای تخدمانی به صورت سرپایی با آنتی‌بیوتیک خوراکی قابل درمان است.

ب) شایع‌ترین عامل عفونت لگنی در زنان یائسه، گنوره است.

ج) کاهش چین واژن و افزایش پارابازال در واژینیت آتروفیک دیده می‌شود.

د) دلگن؛، تب و خوبنیزی، بعد از مقاومت، نشانه سه گانه عفونت لگن؛ است.

**۱۸ - کدام گزینه درباره عوامل خطر سرطان تخدمان صحیح است؟**

- الف) نوع ارثی آن در زنان مسن‌تر رخ می‌دهد.
- ب) تعداد زایمان با خطر سرطان تخدمان ارتیاط مستقیم دارد.
- ج) در زنان کمتر از ۲۰ سال، در ۷۰٪ موارد، تومورها منشأ زرم سل دارند.
- د) مصرف قرص‌های ضدبارداری، خطر سرطان اپیتیلیالی را افزایش می‌دهد.

**۱۹ - کدامیک از موارد زیر در خصوص مراقبت از زنان سزارین شده، صحیح است؟**

- الف) خونریزی تا ۲/۵ لیتر را تحمل می‌کنند.
- ب) جویدن آدامس، عملکرد روده را مختل می‌کند.
- ج) در صورت شک به ایلئوس، رادیوگرافی انجام می‌شود.
- د) استفاده از غذاهای جامد، ۲۴ ساعت بعد از جراحی شروع می‌شود.

**۲۰ - کدامیک از موارد زیر در مورد «واکیوم» صحیح است؟**

- الف) واکیوم یا کاپ مسطح‌تر، احتمال پارگی پوستی را کمتر می‌کند.
- ب) استفاده از کاپ‌های فلزی، احتمال سفالو هماتوم را بیشتر می‌کند.
- ج) تنہ‌های غیرقابل انعطاف در وضعیت آسینکلتیسیم ارجح هستند.
- د) قرار دادن قرینه کاپ نسبت به سوچورسازیتال سبب تشدید آسینکلتیسیم می‌شود.

### بهداشت، تغذیه مادر و کودک و تنظیم خانواده

**۲۱ - جهت برنامه‌ریزی برای اصلاح مراقبت بهداشتی اولیه، کدامیک از اصول زیر باید رعایت شود؟**

- الف) هماهنگی
- ب) دسترسی و سطح‌بندی خدمات
- ج) منابع
- د) استفاده کارآمد از فناوری

**۲۲ - برای پیشگیری از ناباروری، بهترین رویکرد پیشنهادی چیست؟**

- الف) تشویق زوجین به فرزندآوری به موقع (سن مناسب)
- ب) تحرک و فعالیت فیزیکی و تغذیه سالم
- ج) پوشش بیمه‌ای خدمات ناباروری
- د) پیشگیری از مصرف سیگار و الکل

**۲۳ - طبق آخرین دستورالعمل‌های وزارت بهداشت، اولین سونوگرافی از نظر بررسی ناهنجاری‌های جنینی در چه هفته بارداری توصیه می‌شود؟**

- الف) ۱۳ - ۱۱
- ب) ۱۵ - ۱۲
- ج) ۱۸ - ۱۶
- د) ۳۴ - ۳۱

**۲۴ - هموگلوبین یک خانم باردار در نیمه دوم بارداری برابر با  $8 \text{ gr/dl}$  است. طبق دستورالعمل‌های وزارت بهداشت، کدامیک از اقدامات زیر باید انجام شود؟**

- الف) ارجاع فوری به متخصص داخلی
- ب) تجویز ۲ عدد قرص آهن ( $100 \text{ mg}$ ) روزانه پس از انجام آزمایشات لازم
- ج) تجویز ۴ عدد قرص آهن روزانه ( $200 \text{ mg}$ ) پس از انجام آزمایشات لازم
- د) ارائه توصیه‌های تغذیه‌ای + روزانه یک قرص آهن

**۲۵ - متوسط دریافت شیر مادر در هر نوبت تغذیه در نوزاد سه روزه، چند سی سی می‌باشد؟**

- الف) ۷ - ۵
- ب) ۱۰ - ۲
- ج) ۳۰ - ۱۵
- د) ۲۷ - ۲۲



۳۵ - وزن قبل از بارداری خانمی ۸۰ کیلوگرم و قد وی ۱۶۰ سانتی متر می باشد. مطابق دستورالعمل کشوری، **مجندوه** افزایش وزن طبیعی وی چند کیلوگرم می باشد؟

- (الف) ۱۱/۵ - ۱۶  
(ب) ۷ - ۱۱/۵  
(ج) ۹ - ۵  
(د) ۷ - ۳

۳۶ - یک خانم یائسه ۵۴ ساله دچار علائمی از دیزوری، فرکوئنسی و دیسپاروفنی شده است. در آزمایش ادرار، عفونت دیده نشده است، تشخیص و درمان چیست؟

- (الف) عفونت نهفته ادراری و آنتی بیوتیک  
(ب) سنگ ادراری و تجویز آزمایشات تخصصی تر  
(ج) آتروفی واژن و تجویز هورمون سیستمیک  
(د) آتروفی واژن و تجویز هورمون موضعی

۳۷ - کدامیک از حالات زیر در زنان سنین یائسگی بعنوان کمبود قطعی (Deficiency) ویتامین D در نظر گرفته می شود؟

- (الف) کمتر از ۳۰ ng/ml  
(ب) کمتر از ۲۵ ng/ml  
(ج) کمتر از ۲۰ ng/ml  
(د) کمتر از ۳۵ ng/ml

۳۸ - در کدامیک از انواع مطالعات، عامل خطر احتمالی و پیامد بطور همزمان اندازه گیری می شود؟

- (الف) هم گروهی (Cohort)  
(ب) مورد شاهدی (Case - Control)  
(ج) مقطعی (Cross - Sectional)  
(د) کار آزمایی بالینی (Clinical trial)

۳۹ - فشار خون سیستولیک ده نفر زن یائسه به شرح زیر می باشد. میانه فشار خون سیستولیک آنها چقدر می باشد؟

۱۲۵ - ۱۳۰ - ۱۲۵ - ۱۲۰ - ۱۴۰ - ۱۴۵ - ۱۵۰ - ۱۱۰ - ۱۶۰ - ۱۱۵

- (الف) ۱۲۵  
(ب) ۱۲۸  
(ج) ۱۳۰  
(د) ۱۳۵

۴۰ - کدامیک از جملات زیر در خصوص تنظیم حالات خواب و بیداری شیرخوار صحیح است؟

- (الف) همواره خواب و بیداری به طور یکنواخت در طول ۲۴ ساعت دیده می شود.  
(ب) تحریک شیرخوار توسط والدین در طی روز باعث تمرکز خواب در شب می شود.  
(ج) یادگیری تأثیری بر چرخه خواب و بیداری شیرخوار ندارد.  
(د) بلوغ سیستم عصبی تأثیری بر دوره های خواب شبانه ندارد.

### نوزادان و مراقبت های مربوطه

۴۱ - اولین دوره هوشیاری نوزاد بلا فاصله پس از تولد، معمولاً چند دقیقه طول می کشد؟

- (الف) ۲۰  
(ب) ۴۰  
(ج) ۶۰  
(د) ۸۰

۴۲ - کدام گزینه در مورد مراقبت از پنیس نوزاد پسر صحیح است؟

- (الف) هنگام تمیز کردن آلت نوزاد یک روزه، پره پوس به راحتی عقب کشیده می شود.  
(ب) آلت ختنه شده باید با ملایمت شستشو داده شود.  
(ج) آلت ختنه شده باید در معرض هوا قرار گیرد.  
(د) پس از شستشوی آلت، پره پوس باید به عقب کشیده شود.

۴۳ - لمس دو کلیه در نوزاد تازه متولد شده، نشان دهنده کدام مشکل زیر می باشد؟

- (الف) هیدرونفروز  
(ب) عدم وجود مشکل خاص  
(ج) مalfور ماسیون کیستی  
(د) نوروبلاستوما

۴۴ - کودکی که هنگام نوزادی تعویض خون شده است، احتمال کدام عارضه در او وجود دارد؟

- (الف) ترومبوز وریدپورت
- (ب) افزایش بیلی روبین مستقیم
- (ج) غفونت ورید نافی
- (د) افزایش بیلی روبین غیر مستقیم

۴۵ - علائم مرحله تحت حاد در نوزاد مادری که به فنوباربیتال اعتیاد دارد، کدام است؟

- (الف) تحریک پذیری
- (ب) بی خوابی
- (ج) اشتهای شدید
- (د) سکسکه

۴۶ - مقدار منیزیم نوزاد مادری که طی لیبر تحت درمان با سولفات منیزیم بوده است،  $2,8 \text{ g/dL}$  است. حرکات تنفسی نوزاد کاهش یافته و خواب آلوده می‌باشد. اقدام درمانی کدام است؟

- (الف) تعویض خون
- (ب) برقراری دیورز
- (ج) تزریق کلسیم داخل وریدی
- (د) مراقبت حمایتی و حفظ حمایت تنفسی

۴۷ - همه گزینه‌ها از مزایای تماس پوست با پوست مادر و نوزاد بالاصله بعد از تولد است، بجز:

- (الف) ثبات قند خون
- (ب) کاهش اضطراب
- (ج) کاهش مصرف انرژی
- (د) کلونیزاسیون روده شیرخوار با باکتری‌های محیطی

۴۸ - خانم بارداری با سن حاملگی ۱۶ هفته برای دریافت مراقبت‌های دوران بارداری مراجعه کرده است، در حال حاضر به کودک ۱۴ ماهه خود نیز شیر می‌دهد. در چه صورت نیازی به قطع شیردهی نمی‌باشد؟

- (الف) کاهش شیر در سه ماهه دوم
- (ب) سابقه زایمان زودرس
- (ج) کاهش وزن در طول بارداری
- (د) خونریزی رحمی

۴۹ - همه گزینه‌ها در مورد علت وجود کلافه مو در ناحیه لومبوساکرال ستون فقرات نوزاد تازه متولد شده صحیح است، بجز:

- (الف) تجمع موهای لانوگو
- (ب) اسپینابیفیدای پنهان
- (ج) وجود ناهنجاری زمینه‌ای
- (د) وجود مجرای سینوسی

۵۰ - نوزادی که تازه متولد شده است در معاینه اندازه ملاج قدامی اش  $50 \text{ mm}$  است. کدام احتمال برای او مطرح است؟

- (الف) میکروسفالی
- (ب) هایپرتیروئیدی مادرزادی
- (ج) هیدروسفالی
- (د) سینوسبیتوز جمجمه‌ای

۵۱ - هنگام معاینه نوزاد تازه متولد شده در ناحیه سرین و پشت نواحی پیگمانته آبی مایل به خاکستری با حدود مشخص مشاهده شده است. تشخیص کدام است؟

- (الف) تغییر رنگ دلچکی
- (ب) لکه‌های مغولی
- (ج) موتلینگ
- (د) نارسایی جریان خون

- ۵۲** – در مقایسه گرانولوم بند ناف با پولیپ بند ناف، کدام گزینه صحیح است؟
- الف) گرانولوم به دنبال عفونت شدید و منتشر پایه بند ناف رخ می‌دهد.
  - ب) پولیپ از باقی ماندن مجرای امفالومزانتریک شکل می‌گیرد.
  - ج) پولیپ با سوزاندن مکرر با قلم نیترات نقره قابل درمان است.
  - د) درمان گرانولوم ابتدا با آنتی‌بیوتیک تزریقی و سپس جراحی است.
- ۵۳** – نوزاد ترم به دنبال زایمان واژینال گریه نمی‌کند و توں عضلانی کاهش یافته است. اولین اقدام شما چیست؟
- الف) تعیین نمره آپگار و تصمیم‌گیری بر اساس آن
  - ب) ارزیابی ضربان قلب، تنفس و رنگ نوزاد
  - ج) گرم و خشک کردن نوزاد و دادن وضعیت مناسب
  - د) شروع فوری تهویه با فشار مثبت
- ۵۴** – بر اساس دستورالعمل کشوری برقراری تماس پوست با پوست، همه مراقبت‌ها صحیح است، بجز:
- الف) پستان‌ها قبل از زایمان شسته و تمیز شود.
  - ب) نوزاد بلافضله روی شکم مادر قرار گیرد و یک دقیقه بعد بند ناف قطع شود.
  - ج) تزریق ویتامین K و توزین بعد از تغذیه با شیر مادر انجام شود.
  - د) مادر و نوزاد بعد از زایمان طبیعی، همزمان و همراه هم به اتاق بعد از زایمان منتقل شوند.
- ۵۵** – کدامیک از رفتارهای زیر در نوزاد غیر ارادی است؟
- الف) خیرگی نگاه
  - ب) چرخاندن سر
  - ج) لبخند زدن
  - د) مکیدن
- ۵۶** – کدامیک از مشخصات نوزاد کم انگیخته «Under aroused» می‌باشد؟
- الف) گرفتگی
  - ب) رنگ پریدگی دور دهان
  - ج) ناتوانی در ارتباط
  - د) گریه تسکین‌ناپذیر
- ۵۷** – واکنش نوزادی به دنبال سوزن زدن مکرر به پاشنه پا تدریجا کمتر می‌شود، این چه پدیده‌ای است و در چه حالتی دیده می‌شود؟
- الف) خوکردن، در حالت خواب عمیق
  - ب) خوکردن، در حالت خواب آلودگی
  - ج) بی‌ثباتی اتونوم، در حالت خواب عمیق
  - د) بی‌ثباتی اتونوم، در حالت خواب آلودگی
- ۵۸** – به دنبال تهویه با فشار مثبت در نوزاد ترم نیازمند احیاء، ضربان قلب جنین به ۷۵ ضربه رسیده است. اقدام بعدی شما کدام است؟
- الف) تجویز اکسیژن با هود
  - ب) تجویز اپی‌نفرین
  - ج) فشردن قفسه سینه
  - د) ادامه تهویه با فشار مثبت
- ۵۹** – کدام وضعیت نوزادی می‌تواند مانع ترجیح زود هنگام نوزاد گردد؟
- الف) تعداد تنفس کمتر از ۶۰ بار در دقیقه
  - ب) زردی ۲۴ ساعت اول تولد
  - ج) دفع ادرار و مدفع
  - د) حرارت زیر بغل ۳۶,۳ درجه سانتی گراد
- ۶۰** – کدام گزینه درباره وضعیت ویتامین‌های نوزاد نارس صحیح است؟
- الف) کمبود ویتامین E در نوزادان نارس بسیار شایع است.
  - ب) کاهش جذب چربی احتمالاً با کاهش جذب ویتامین D همراه است.
  - ج) متabolیسم فنیل آلانین و تیروزین به میزان اسید فولیک بستگی دارد.
  - د) کمبود ویتامین C باعث کاهش سنتز هموگلوبین می‌شود.



## جنین‌شناسی

۶۱ - دلیل رقیق شدن موکوس گردن رحم کدام یک از موارد زیر است؟

- (الف) افزایش هورمون استروژن
- (ب) کاهش ترشح غدد رحمی
- (ج) زیاد شدن مایع فولیکولی
- (د) کاهش جریان خون سرخرگ‌های رحمی

۶۲ - کدام یک از موارد زیر سبب ایجاد تنگی حلقوی (Ring Constriction) در قسمت‌های مختلف بدن جنین می‌شود؟

- (الف) Single Umbilical artery
- (ب) Twin Transfusion syndrom
- (ج) Fused Placenta
- (د) Amniotic Band

۶۳ - مهارکننده بلوغ اووسیت (Oocyte Maturation Inhibitor) در زمان جنینی، توسط کدام یک از ساختمان‌های زیر ترشح می‌شود؟

- (الف) Zona Pellucida
- (ب) Germinal Epithelium
- (ج) Follicular Cells
- (د) Corpus Luteum

۶۴ - لایه احشایی مزودرم خارج رویانی (Visceral) در اطراف کدام یک از ساختمان‌های زیر دیده می‌شود؟

- (الف) کیسه زرد
- (ب) کیسه آمنیون
- (ج) حفره کوریون
- (د) اطراف سیتوتروفوبلاست

۶۵ - آلتنتوئیس (Allantois) از کدام یک از ساختمان‌های زیر منشاء می‌گیرد؟

- (الف) Chorionic Plate
- (ب) Yolk Sac
- (ج) Prechordal Plate
- (د) Umbilical Cord

۶۶ - بین دو لایه احشایی و جداری مزودرم داخل رویانی، کدام یک از ساختمان‌های زیر تشکیل می‌شود؟

- (الف) Chorionic Cavity
- (ب) Intraembryonic cavity
- (ج) Intermediate mesoderm
- (د) Dermomyotom

۶۷ - الگوی شکل‌گیری عضلات، تحت تأثیر کدام مورد زیر است؟

- (الف) نحوه مهاجرت سلول‌های ستیغ عصبی
- (ب) ترتیب به هم پیوستن میوبلاست‌ها
- (ج) بافت همبند مشتق از سومیت‌ها و ستیغ عصبی
- (د) استخوان‌های اطراف عضله

۶۸ - کدام یک از ساختارهای زیر شاخ قدامی نخاع را ایجاد می‌کند؟

- (الف) صفحه سقفی
- (ب) صفحه کفی
- (ج) صفحه قاعده‌ای
- (د) صفحه بالی

۶۹ - خونرسانی بخش شکمی پیشین روده از کدام شریان است؟

- (الف) مزانتریک فوقانی
- (ب) مزانتریک تحتانی
- (ج) تنہ سلیاک
- (د) فرنیک تحتانی

- ۷۰ - در صورتی که سپتوم آئورتیکوپولموناری به صورت مارپیچ تشکیل نشود، کدام ناهنجاری مادرزادی ایجاد می‌گردد؟  
 الف) تترالوژی فالو  
 ب) جابه‌جا شدن عروق بزرگ  
 ج) آترزی دریچه ریوی  
 د) باقی ماندن تنه شریانی
- ۷۱ - کدام شریان از سومین قوس آئورتی منشاء می‌گیرد؟  
 د) کاروتید مشترک      ج) ماغزیلاری      ب) ساپکلاوین راست      الف) تنہ ریوی
- ۷۲ - در هفته پنجم زندگی داخل رحمی، کدام ساختار در ضخامت مزوگاستر پشتی تکامل می‌یابد؟  
 د) کیسه صfra      ج) پانکراس      ب) کبد      الف) طحال
- ۷۳ - کدام یک از موارد زیر از ابتدای پیشین روده در هفته چهارم زندگی داخل رحمی منشاء می‌گیرد؟  
 الف) جوانه کبدی  
 ب) جوانه کیسه صfra  
 ج) جوانه پانکراتیک شکمی  
 د) جوانه ریوی
- ۷۴ - در زمان لانه‌گزینی، رحم در کدام فاز زیر است؟  
 Follicular      Menstrual      Secretory      Proliferative      الف) Follicular
- ۷۵ - در طی دومین ماه رشد جنین در داخل رحم، سن رویان بر اساس کدام یک از معیارهای زیر سنجیده می‌شود؟  
 Crown Rump length      Crown Heel length      Weight of embryo      Number of somites      الف) Crown Rump length
- ۷۶ - باقی ماندن شیار اولیه (Primitive Streak) پس از تولد، منجر به کدام یک از ناهنجاری‌های زیر می‌شود؟  
 Caudal Dysgenesis      Situs Inversus      Coccygeal Teratoma      Kartagener Syndrom      الف) Caudal Dysgenesis
- ۷۷ - لوله‌های اپیژنیتال (Epigenital Tubules) در جنس مذکور، در تشکیل کدام یک از ساختمان‌های زیر نقش دارد؟  
 الف) مجرای واپران      ب) اپیدیدیم      ج) شبکه بیضه      د) مجرای انزالی
- ۷۸ - در صورتی که کلیه از بین سرخرگ‌های نافی نتواند عبور کند و نزدیک به سرخرگ ایلیاک مشترک باقی بماند، چه نوع کلیه‌ای را ایجاد می‌کند؟  
 د) تحلیل رفتہ      ج) نافی      ب) لگنی      الف) نعل اسپی
- ۷۹ - پرده‌های اولیه در حین تکامل جفت در کدام هفته تشکیل می‌شوند؟  
 د) چهارم      ج) سوم      ب) دوم      الف) اول
- ۸۰ - Chordal Chondrocranium منشاء کدام یک از استخوان‌های جمجمه است؟  
 Sphenoid      Frontal      Mandible      Occipital      الف) Sphenoid

## بیماری‌های داخلی و جراحی مربوط به مامایی

- ۸۱ - همه موارد درباره اداره آسم در بارداری و زایمان صحیح است، بجز:

- الف) در آسم خفیف تجویز بتا آگونیست کفايت می کند.

ب) در آسم پا بر جا کورتیکو استروئید استنشاقی لازم است

ج) تجویز پروستاگلاندین  $E_1 - E_2$  در لیبر ممنوع است

د) در تسکین درد لیبر فنتانیل به مپریدین ارجح است

<sup>۸۲</sup> - بر اساس دستورالعمل کشوری همه گزینه‌ها درباره امتیازدهی عوامل خطر پیشگیری از ترومبوآمبولی وریدی

صحیح است، بجز: (VTE)

- الف) امتیاز ۴ و بیشتر در بارداری نیاز به شروع ضد انعقاد از هفته ۱۴ بارداری دارد.

ب) امتیاز ۳ در بارداری نیاز به شروع ضد انعقاد از هفته ۲۸ بارداری دارد.

ج) ارزیابی عوامل خطر یک بار قبل، یک بار حین بارداری و در هر بار پذیرش بیمارستانی لازم است.

د) ساقه ترومبوفیلی و تحریک پیش از حد تخدمانی، هر یک امتیاز ۴ کسب می‌کنند.

۸۳ - خانمی مبتلا به ادم کار دیوژنیک هیدروستاتیک است. کدامیک از موارد زیر صحیح است؟

- الف) زایمان سزارین الزامی است.

ب) تجویز داروهای کاردیوژنیک توصیه می‌شود.

ج) فورزما پد ۲۰ تا ۴۰ میلی گرم وریدی داده می شود.

د) نارسایی دهليزی منجر به ادم ریه در پارداری است.

۸۴- کدامیک از موارد زیر براي درمان زن مبتلا به اکلامیسي صحیح نیست؟

- الف) تجویز متناوب دیورتیک‌ها

#### ب) تجویز عوامل هیپر اسموتیک

ج) کنترل تشنج با دوز لومنیگ داخل عضلانی سولفات منیزیم

۵) تجویز متناوب یک داروی ضد فشار خون

۸۵- کدامیک از موارد زیر در خصوص پیلونفریت حاد پارداری صحیح است؟

- الف) درد حاد متناوب در هر دو ناحیه کمری رخ می‌دهد.

ب) از علل اصلی شوک سپتیک در دوران بارداری است.

ج) از عوارض نامعمول در بارداری است.

د) تب و لرزهای دیررس، رخ می‌دهد.

۸۶- کدامک از موارد زیر در مورد تغییرات کلیه در یارداری صحیح می‌باشد؟

- (الف) اندازه کلیه حدود ۳ سانتی متر افزایش می یابد.

(ب) کلیرنس کراتی نین کاهش می یابد.

(ج) آستانه بیکربنات کلیوی کاهش می یابد.

(د) میزان دفع ادرار، اسددها، آمننه افزایش می یابد.

- د، یا، و له بوس، د، یار، دار، همه گزینه‌ها صحیح است، بخ: ۸۷

- (الف) اغلب نوزادان دچار لوپوس جلدی پایدار می‌شوند.

(ب) عوارض جنینی، ناشی از واسکولوپاتی دسیدوا است.

(ج) آزاتیوپرین در نفریت لوپوسی توصیه می‌شود.

(د) ب دنبیون: خم، اکم، دماد، شدید تهصیه می‌شود.

**۸۸ - کدامیک از موارد زیر در مورد هیپرتانسیون ریوی در بارداری صحیح است؟**

- الف) هیپرتانسیون ریوی ناشی از بیماری‌های ریوی بدترین پروگنوز را دارد.
- ب) در رادیوگرافی قفسه سینه، تنگی شرایین ناف ریه دیده می‌شود.
- ج) پرهیز از قرار گرفتن به وضعیت خوابیده به پشت توصیه می‌شود.
- د) اکسیدنیتریک استنشاقی در موارد اختلال مزمن قلبی استفاده شود.

**۸۹ - مطابق دستورالعمل کشوری مادری ایمن، در صورت مراجعه زن باردار با حمله میگرن، یک ماما چه اقدامی را قبل از ارجاع به متخصص باید انجام دهد؟**

- الف) تجویز عضلانی آمپول ۲۵ میلی گرم پرومتوازین و قرص یا شیاف استامینوفن
- ب) تجویز عضلانی آمپول ۵۰ میلی گرم پرومتوازین و قرص یا شیاف استامینوفن
- ج) تجویز قرص یا شیاف استامینوفن
- د) ارجاع فوری به متخصص

**۹۰ - همه موارد درباره پیامدهای دیابت بارداری صحیح است، بجز:**

- الف) هیپرتانسیون و سزارین افزایش می‌یابد
- ب) میزان ناهنجاری جنینی بطور چشمگیری افزایش می‌یابد
- ج) مرده‌زایی غیر قابل توجیه افزایش می‌یابد
- د) ماکروزمی پیامد اصلی محسوب می‌شود

**۹۱ - در خانم باردار با  $BMI = 30$ ، خطر نسبی (OR)، کدامیک از عوارض زیر بیشتر است؟**

- الف) دیابت بارداری
- ب) ماکروزومی
- ج) دیستوژنی شانه
- د) زایمان پره ترم

**۹۲ - خانم ۳۱ ساله  $G_3P_2L_2$  مبتلا به بیماری قلبی در جریان لیبر قرار داشته و درخواست عقیمسازی هم دارد. کدام**

**گزینه برای وی توصیه نمی‌شود؟**

- الف) سزارین الکتیو و عقیمسازی همزمان انجام شود.
- ب) زایمان واژینال ارجح بوده و عقیمسازی به تأخیر انداخته شود.
- ج) در طول لیبر در وضعیت خوابیده به پهلو قرار گیرد.
- د) درد مادر با بی‌دردی اپیدورال مداوم تسکین یابد.

**۹۳ - خانم بارداری که در معرض سرب گرفته است، میزان سرب خون ۶ میکروگرم در دسی‌لیتر گزارش شده است.**

**کدام اقدام صحیح است؟**

- الف) انجام مشاوره و ختم بارداری
- ب) مشاوره، حذف منبع و بررسی مجدد میزان سرب خون
- ج) حذف منبع - انجام درمان سرب‌زدایی
- د) انجام درمان سرب‌زدایی و اندازه‌گیری مجدد سرب خون

**۹۴ - کدام گزینه درباره اختلالات هماتولوژیک در بارداری صحیح است؟**

- الف) زنان مبتلا به تالاسمی مینور، نیازی به مصرف آهن و اسیدفولیک ندارند.
- ب) در تالاسمی ماذور با ترانسفوزیون مکرر خون هموگلوبین بالای  $10\text{ mg/dl}$  نگه داشته شود.
- ج) ترومبوسیتوپنی بارداری در اثر کوتاه شدن عمر پلاکت معمول است.
- د) در اغلب مبتلایان ترومبوسیتوپنی، سرولوژی لوبوسی مثبت است.

**۹۵ - درباره تیروئیدیت بعد از زایمان، کدام عبارت صحیح است؟**

- (الف) در زنان با سابقه آنتی بادی تیروئیدی در بارداری، احتمال آن نادر است.
- (ب) شکایت اصلی زنان در شروع بیماری، خستگی و تپش قلب است.
- (ج) عموماً به شکل هیبو تیروئیدی خود را نشان می دهد.
- (د) اغلب در ماههای اول بعد از زایمان رخ می دهد.

**۹۶ - کدامیک از موارد زیر در مورد سقط صحیح می باشد:**

- (الف) سقطهای یوپلئیدی زودتر از سقطهای آنوبلئید رخ می دهد.
- (ب) میزان سقط آنوبلئید تقریباً در هفته ۱۳ حاملگی به حد اکثر می رسد.
- (ج) مونوزومی شایع ترین اختلال کروموزم منفرد محسوب می شود.
- (د) سن بالای مادر، میزان بروز سقط تریپلئیدی را افزایش می دهد.

**۹۷ - بیشترین درصد عوارض در نوزادان مادران مبتلا به فنیل کتونوری درمان نشده، کدام یک از موارد زیر است؟**

- (الف) سقط خودبه خودی
- (ب) عقب ماندگی ذهنی و تکاملی
- (ج) میکروسفالی
- (د) محدودیت رشد جنبی

**۹۸ - خانمی مبتلا به استفراغ شدید بارداری است. کدامیک از موارد زیر صحیح است؟**

- (الف) مذکور بودن جنبی، خطر آن را افزایش می دهد.
- (ب) درمان با گلوکورتیکوئیدها شروع شود.

- (ج) در صورت تداوم استفراغ بعد از درمان، تغذیه انترال شروع شود.
- (د) ویتامین K برای پیشگیری از آنسفالوپاتی ورنیکه تجویز می شود.

**۹۹ - برای خانم مبتلا به دیابت بارداری که به طور الکتیو جهت زایمان بستری شده است. کدام اقدام در جریان لیبر صحیح است؟**

- (الف) شروع انفوژیون دکستروز از ابتدای بستری
- (ب) حذف دوز صحبتگاهی انسولین
- (ج) تجویز انسولین رگولار در صورت گلوکز خون بالاتر از  $200 \text{ mg/dl}$
- (د) ارزیابی سطح گلوکز خون هر یک ساعت در آزمایشگاه

**۱۰۰ - کدام گزینه درباره پیامدهای بارداری در زنان مبتلا به فشار خون مزمن صحیح است؟**

- (الف) تشدید فشار خون در سراسر بارداری
- (ب) افزایش حجم داخلی عروقی
- (ج) افزایش ۵ - ۶ برابری در دکولمان
- (د) افزایش خطر نقایص قلبی جنبی

### روانپزشکی در مامایی و اختلالات جنسی

**۱۰۱ - خانمی به دلیل دیسپارونیا ناشی از یائسگی مراجعه کرده است. طبق مدل PLISSIT اولین مرحله برای مشاوره چیست؟**

- (الف) بیان این که دیسپارونیا در زنان منوپوز شایع است.
- (ب) مکانیسم درد برای او توضیح داده شود.
- (ج) نقش هورمون ها در یائسگی توضیح داده شود.
- (د) ارجاع برای درمان فشرده انجام شود.

۱۰۲ - کدامیک از موارد ذیل در مورد تمنای جنسی صحیح می باشد؟

- الف) تمنای جنسی قویاً تحت تأثیر خستگی قرار می گیرد.
- ب) پرولاکتین پاسخ سکسوآل را بر می انگیزد.
- ج) نوراپی نفرین پاسخ سکسوآل را مهار می کند.
- د) فاکتورهای بیولوژیک مستقل از فاکتورهای محیطی عمل می کنند.

۱۰۳ - بهترین پیش‌بینی کننده تمنای جنسی، کدامیک از موارد ذیل می باشد؟

- د) سایکوپاتولوژی
- ب) ارتباطی
- ج) شناختی
- ج) طبی

۱۰۴ - واژینیسموس انقباضات غیر ارادی کدام قسمت واژن می باشد؟

- د)  $\frac{2}{3}$  داخلی
- ج)  $\frac{1}{3}$  خارجی
- ب)  $\frac{2}{3}$  خارجی
- الف)  $\frac{1}{3}$  خارجی

۱۰۵ - همه موارد ذیل در مورد دیسپارونیا صحیح است، بجز:

- الف) معمولاً این اختلال همراه با واژینیسموس می باشد.
- ب) علل عضوی آن باید رد شود.
- ج) در اکثر موارد عوامل دینامیک عامل سببی محسوب می شود.
- د) بلافاصله پس از یائسگی افزایش و ادامه می یابد.

۱۰۶ - از نظر پیازه، علت گوش نکردن کودک ۴ ساله به این سخن مادرش چیست؟ «ساکت باش، چون برادرت درس دارد»

- الف) تفکر جادوی
- ب) خود محوری
- ج) بازگشت‌پذیری
- د) کارکرد نشانه‌ای

۱۰۷ - در نظریه دلبستگی (از دیدگاه اینزورت)، موارد زیر از پیامدهای دلبستگی ایمن کودک به مادر است، بجز:

- الف) کاهش اضطراب
- ب) وابستگی به مادر
- ج) توانایی کاوش محیط
- د) توانایی دل کنند از دلبسته‌ها

۱۰۸ - بیماری با اختلال «استرس پس از سانحه» به دنبال خرابی خانه‌اش پس از وقوع سیل، با «شنیدن صدای آب»،

منظمه وحشت‌زدگی سیل برای او تداعی می شود، کدامیک از انواع شرطی‌سازی‌ها، علت ترس او را تبیین می کند؟

- د) خاموشی‌سازی
- ج) تقابلی
- ب) عامل
- الف) کلاسیک

۱۰۹ - در کدامیک از موارد زیر، درمانگر به بیمار شرح می دهد که باید اطلاعات جلسه مشاوره را با مسئولین قانونی در میان بگذارد؟

- الف) سالمند آزاری
- ب) خیانت به همسر
- ج) تجاوز جنسی
- د) همسر آزاری

۱۱۰ - در فرآیند مصاحبه با مراجع، در هنگام «مرور روان‌پزشکی سیستم‌ها» کدامیک از علایم زیر می‌تواند احتمال «روان‌پریشی (سایکوز)» فرد را مطرح کند؟

- الف) ترس از ارتفاع و هوایپما
- ب) کاهش نیاز به خواب، ولخرچی
- ج) شنیدن صدای اموات و گفتگو با آنها
- د) کابوس شبانه و از جا پریدن





## زبان عمومی

### Part one: Vocabulary

Directions: Complete the following sentences by choosing the best answer.

**121 –** The nurse was not eager to ..... the new responsibility because she wanted to spend more time with her children.

- a. reject
- b. assume
- c. promote
- d. leave

**122 –** Some students get upset when they feel that they have failed to ..... their ambitions.

- a. disregard
- b. dissolve
- c. ignore
- d. fulfill

**123 –** Because of the negative effects of being overweight, her doctor warned her that losing weight was .....

- a. hazardous
- b. challenging
- c. critical
- d. bothering

**124 –** He must have ..... stomach infection by eating in unclean restaurants.

- a. passed out
- b. taken off
- c. looked after
- d. picked up

**125 –** This drug helps to ..... the disease symptoms and reduce the risk of re-infection.

- a. consolidate
- b. alleviate
- c. intimidate
- d. complicate

**126 –** Due to an unpredictable happening during the surgery, they had to ..... their operation plan.

- a. utilize
- b. alter
- c. continue
- d. navigate

**127 –** In recent years, the ..... influence of heavy smoking on the lungs has attracted the attention of physicians and pathologists.

- a. promoting
- b. tedious
- c. deleterious
- d. complementing

**128 –** Some chemical drugs have limited use due to their possible ..... effects.

- a. adverse
- b. beneficial
- c. enhancing
- d. energizing

**129 –** Everybody should take some preventive ..... to fight fatal diseases such as cancer, AIDS, etc.

- a. consequences
- b. incidents
- c. measures
- d. drawbacks

**130 –** The doctor made the patient ..... different tests so that he can diagnose his disease.

- a. go through
- b. give up
- c. give off
- d. go over

**131 –** Genetic engineering can help ..... or at least alleviate many problems, such as diabetes or other genetic disease.

- a. reproduce
- b. deteriorate
- c. complicate
- d. eliminate

**132 –** Because medical specialists tend to work in large cities, patients in rural and remote regions are often medically .....

- a. assisted
- b. collaborated
- c. underserved
- d. consulted

**133 –** If you are in partial ....., it may mean you can take a break from treatment as long as the cancer doesn't begin to grow again.

- a. remission
- b. aggravation
- c. exacerbation
- d. deterioration

**134 –** Upon the onset of an infection, almost ....., all microorganisms start disseminating into the blood.

- a. provisionally
- b. impressively
- c. voluntarily
- d. invariably

**135 –** He suddenly ..... and we had to revive him by splashing water on his face.

- a. refined
- b. fainted
- c. faded
- d. declined

**136 –** Some scientists believe that some African monkeys are the original ..... of HIV, the virus that causes AIDS.

- a. trend
- b. source
- c. enemy
- d. opponent



137 - The word "fragile" on the box ..... that it should be handled with care.

- a. comprises
- b. contains
- c. signifies
- d. denies

138 - The lecture was so ..... that the medical students failed to understand it.

- a. evident
- b. vague
- c. vacant
- d. fantastic

139 - He went abroad to ..... his education in his desired field in a prestigious university.

- a. pursue
- b. abandon
- c. probe
- d. postpone

140 - People living in this polluted area usually ..... lung disease due to highly poisonous substances in the air.

- a. cooperate with
- b. get rid of
- c. overcome
- d. contract

## Part two: Reading Comprehension

Directions: Read the following passages carefully. Each passage is followed by some questions. Complete the questions with the most suitable words or phrases(a, b, c, or d). Base your answers on the information given in the passage only.

### Passage 1

Looking across countries, there are great differences in life expectancy. There are also sharp differences in who dies and from what. Deaths among children account for approximately 30 percent of deaths in poor countries but less than 1 percent of deaths in rich countries. Most deaths in rich countries are from cancers and cardiovascular diseases, while most deaths in poor countries are from infectious diseases.

Though differences persist, many poor countries have recently experienced large improvements in life expectancy. In India and China, life expectancy has risen by 30 years since 1950s. Even in Africa, life expectancy rose by 13 years from the early 1950s until the late 1980s, when the spread of HIV/ AIDS reversed the trend.

What factors explain **this outcome**? Some of the main factors are changes in income, literacy (especially among women), and the supply of calories. Public health interventions such as immunization campaigns, improvements in water supply and the use of antibiotics have also made a big difference.

141 - According to the passage, infectious diseases .....

- a. are the major cause of death among children
- b. kill more people than any other diseases
- c. are the most dangerous enemy of the poor people
- d. compared to cancer are more dangerous

142 - The first paragraph mostly discusses .....

- a. types and victims of deadly diseases
- b. life expectancy in poor and rich countries
- c. infectious and non-infectious diseases
- d. effects of infectious diseases in poor countries

143 - According to the passage, life expectancy .....

- a. differently improved in India and China
- b. caused great medical development in China
- c. decreased because of heart diseases
- d. improved due to many factors

144 - Improvement of life expectancy in African countries was greatly ..... by AIDS.

- a. strengthened
- b. hindered
- c. intensified
- d. evolved



**145** "This outcome" in paragraph 3, refers to .....

- a. improvement in people's life expectancy
- b. decrease of life expectancy in Africa
- c. changes in people's income
- d. spread of AIDS in African countries

## Passage 2

The term breathing-related sleep disorder refers to a spectrum of breathing abnormalities ranging from chronic or habitual snoring to upper airway resistance syndrome (UARS) to **frank** obstructive sleep apnea (OSA) or, in some cases, obesity hypoventilation syndrome (OHS).

In adults, there is a male preponderance of OSA during middle age. In women, menopause, pregnancy and polycystic ovaries are associated with increased risk. In children, prevalence ranges between 1 and 4% with habitual snoring prevalence at about 7.45%.

Restless sleep at night is the biggest symptom of this sleep disorder. If the symptoms are ignored, there are many serious dangers that may develop because of sleep apnea. Some of these include high blood pressure, stroke, heart failure, irregular heartbeats, heart attacks, diabetes, depression, as well as other problems. This is why treatment for sleep apnea is so important if the symptoms of breathing-related sleep disorder appear.

While there may be some physical aspects of treatment for a breathing-related sleep disorder, the power of psychotherapy should not be forgotten. Treatment can require major changes in lifestyle. Appropriate weight management strategies and compliance with either positive airway support or the use of a dental appliance usually represent a lifetime commitment. For this reason, some patients have explored surgical alternatives.

**146 – The disorder discussed here .....**

- a. includes a wide range of breathing problems
- b. usually results from OHS and OSA
- c. may develop into residual hearing anomalies
- d. mainly affects pregnant or menopause women

**147 – The word "frank", in the first paragraph, is closest in meaning to .....**

- a. honest
- b. weary
- c. sincere
- d. obvious

**148 – Obstructive sleep apnea is found among .....**

- a. sensible middle-aged men
- b. socially high risk women
- c. males, females and even children
- d. rural groups with different proportions

**149 – Some people suffering from breathing-related sleep disorder prefer surgical procedure mainly because .....**

- a. it is believed to be cost effective
- b. psychologically speaking, it is more appealing
- c. using dental or airway appliances are hardly effective
- d. most other treatment alternatives require lifetime commitment

**150 – According to the text, for treating breathing-related sleep disorder, one .....**

- a. should merely resort to physical treatments
- b. can also consider psychological approaches
- c. must consult a psychologist first
- d. should ignore alternative lifestyles



## Passage 3

Fever, a common medical sign, forms about 30% of healthcare visits by children and occurs in around 75% of adults who are seriously sick. Fever is defined as having a temperature above the normal range (i.e. between 37.5 and 38.3 °C) due to an increase in the body's temperature set point. Such an increase triggers increased muscle contractions and causes a feeling of cold, resulting in greater heat production. Body temperature is mainly regulated in the hypothalamus, which functions like a thermostat. When the set point temperature returns to normal, a person feels hot, becomes flushed, and may begin to sweat. Fevers do not typically go higher than 41-42 °C.

Treatment to reduce fever is generally not required. However, treating the associated pain and inflammation may help the sufferer rest. Medications like ibuprofen or acetaminophen may lower body temperature. Measures such as putting a cool towel on the forehead and having a slightly warm bath are not useful. Children below three months suffering from fever require medical attention, as might people with serious conditions such as a compromised immune system. While fever is a useful defense mechanism, treating fever does not appear to worsen outcomes. A fever may rarely trigger a febrile seizure, which is more common in young children. However, fever is viewed with greater concern by parents and healthcare professionals than it deserves, a phenomenon known as fever phobia.

**151 – According to the text, fever can .....**

- a. be overlooked above the normal range
- b. cause a compromised immune system
- c. stimulate a febrile seizure in a person
- d. account for 75% of healthcare services

**152 – Fever phobia is mentioned in the passage because .....**

- a. it is the source of febrile seizures
- b. fever is often considered to be more serious than it is
- c. health professionals are concerned about its consequences
- d. parents are afraid of home remedies

**153 – In the human body, hypothalamus acts as a thermostat and helps the .....**

- a. person feel hot and exhausted
- b. sufferer get flushed and contracted
- c. medications increase body temperature
- d. set point temperature return to normal

**154 – According to the passage, ..... may be helpful in settling fever.**

- a. a cool towel on the forehead
- b. medications such as ibuprofen
- c. having a slightly warm shower
- d. triggering muscle contraction

**155 – According to the text, newborns affected with fever may .....**

- a. escape serious outcomes
- b. suffer from fever phobia
- c. need medical care
- d. worsen the treatment



## Passage 4

Everyone thinks that diabetes is a disease where the patient excretes a lot of sugar, is very thin and is inordinately thirsty. But there are many people who probably have diabetes and won't know they have it until a severe symptom arises. However, there are some minor warning symptoms to look out for. Diabetes tends to be hereditary. If you have a diabetic parent, brother, sister or even aunt, there is an increased risk of the disease. If a woman unexpectedly has one or two failed pregnancies, it will need to be investigated in several ways, but the possibility of her being a diabetic must be reckoned with. Similarly, a mother who produces a really large child, for example over four and a half kilos, needs to consider this possibility. One of the early signs of diabetes is when the patient feels disturbed by boils or skin swellings for no apparent reason. Another skin condition associated with diabetes is when there is disturbing itching, generally at night, after a visit to the rest room. Lastly, if it turns out that you do have diabetes, don't jump to the conclusion that injections will be essential. It may well be possible to treat you either by diet alone or by insulin taken by mouth. So, if you have any suspicions at all that you may have diabetes, don't be afraid to consult your doctor.

**156 – Which of the following is NOT mentioned as a mild symptom of diabetes?**

- a. Excessive sugar excretion
- b. Several miscarriages
- c. Boils and itching
- d. Delivery of thin babies

**157 – Patients are advised to ..... when they are suspicious of having diabetes.**

- a. consult a physician
- b. inject insulin
- c. avoid frequent pregnancies
- d. ignore family history

**158 – It is stated in the passage that many diabetics are unaware of their disease until .....**

- a. they become extremely thirsty
- b. their relatives inform them
- c. some serious signs emerge
- d. they observe trivial symptoms

**159 – Skin problems are considered to be among the warning symptoms of .....**

- a. diabetes
- b. failed pregnancy
- c. heredity diseases
- d. itching

**160 – The public belief associates diabetes with .....**

- a. sugar accumulation
- b. excessive thirst
- c. obesity problems
- d. apparent itching

موفق باشید

دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی و مرکز سنجش آموزش پزشکی با هدف ارتقای کیفیت سوالات و بهبود روند اجرای آزمون‌ها، پذیرای درخواست‌های بررسی سوالاتی است که در قالب مشخص شده زیر از طریق اینترنت ارسال می‌گردد، تا کار رسیدگی با سرعت و دقت بیشتری انجام گیرد.

ضمن تشکر از همکاری داوطلبان محترم موارد ذیل را به اطلاع می‌رساند:

- ۱- کلید اولیه سوالات ساعت ۱۸ مورخ ۹۸/۰۴/۲۹ از طریق سایت اینترنتی [www.sanjeshp.ir](http://www.sanjeshp.ir) اعلام خواهد شد.
- ۲- اعتراضات خود را از ساعت ۱۸ مورخ ۹۸/۰۴/۲۹ لغایت ساعت ۱۲ مورخ ۹۸/۰۵/۰۱ به آدرس اینترنتی بالا ارسال نمایید.
- ۳- اعتراضاتی که به هر شکل خارج از فرم ارائه شده، بعد از زمان تعیین شده و یا به صورت غیراینترنتی (حضوری) ارسال شود، مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت.

#### تذکر مهم:

- \* فقط اعتراضات ارسالی در فرصت زمانی تعیین شده، مورد بررسی قرار گرفته و پس از تاریخ مذکور به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- \* از تکرار اعتراضات خود به یک سوال پرهیز نمایید. تعداد اعتراض ارسالی برای یک سوال، ملاک بررسی نمی‌باشد و به کلیه اعتراضات ارسالی اعم از یک برگ و یا بیشتر رسیدگی خواهد شد.

دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی،  
مرکز سنجش آموزش پزشکی  
بهداشت و تخصصی

نام:	نام خانوادگی:	کد ملی:		
نام رشته:	نام درس:	نام دفترچه:		
نام منبع معتبر	سال انتشار	صفحه	پاراگراف	سطر

#### سوال مورد بررسی:

- بیش از یک جواب صحیح دارد. (با ذکر جواب‌های صحیح)
- جواب صحیح ندارد.
- متن سوال صحیح نیست.

#### توضیحات:

## گلید اولیه

### مجموعه ماما می

**توجه:** اگر این پاسخنامه متعلق به شما نیست، مسئول جلسه را آگاه سازید. پاسخ سوالات باید با مداد مشکی نرم و پرنگ در بخش مربوطه مطابق نمونه صحیح علامت گذاری شود. نحوه علامتگذاری: صحیح غلط



لطفاً در این مستطیل ها هیچگونه علامتی نزنید.

۱	۵۱	۱۰۱	۱۵۱	۲۰۱	۲۵۱
۲	۵۲	۱۰۲	۱۵۲	۲۰۲	۲۵۲
۳	۵۳	۱۰۳	۱۵۳	۲۰۳	۲۵۳
۴	۵۴	۱۰۴	۱۵۴	۲۰۴	۲۵۴
۵	۵۵	۱۰۵	۱۵۵	۲۰۵	۲۵۵
۶	۵۶	۱۰۶	۱۵۶	۲۰۶	۲۵۶
۷	۵۷	۱۰۷	۱۵۷	۲۰۷	۲۵۷
۸	۵۸	۱۰۸	۱۵۸	۲۰۸	۲۵۸
۹	۵۹	۱۰۹	۱۵۹	۲۰۹	۲۵۹
۱۰	۶۰	۱۱۰	۱۶۰	۲۱۰	۲۶۰
۱۱	۶۱	۱۱۱	۱۶۱	۲۱۱	۲۶۱
۱۲	۶۲	۱۱۲	۱۶۲	۲۱۲	۲۶۲
۱۳	۶۳	۱۱۳	۱۶۳	۲۱۳	۲۶۳
۱۴	۶۴	۱۱۴	۱۶۴	۲۱۴	۲۶۴
۱۵	۶۵	۱۱۵	۱۶۵	۲۱۵	۲۶۵
۱۶	۶۶	۱۱۶	۱۶۶	۲۱۶	۲۶۶
۱۷	۶۷	۱۱۷	۱۶۷	۲۱۷	۲۶۷
۱۸	۶۸	۱۱۸	۱۶۸	۲۱۸	۲۶۸
۱۹	۶۹	۱۱۹	۱۶۹	۲۱۹	۲۶۹
۲۰	۷۰	۱۲۰	۱۷۰	۲۲۰	۲۷۰
۲۱	۷۱	۱۲۱	۱۷۱	۲۲۱	۲۷۱
۲۲	۷۲	۱۲۲	۱۷۲	۲۲۲	۲۷۲
۲۳	۷۳	۱۲۳	۱۷۳	۲۲۳	۲۷۳
۲۴	۷۴	۱۲۴	۱۷۴	۲۲۴	۲۷۴
۲۵	۷۵	۱۲۵	۱۷۵	۲۲۵	۲۷۵
۲۶	۷۶	۱۲۶	۱۷۶	۲۲۶	۲۷۶
۲۷	۷۷	۱۲۷	۱۷۷	۲۲۷	۲۷۷
۲۸	۷۸	۱۲۸	۱۷۸	۲۲۸	۲۷۸
۲۹	۷۹	۱۲۹	۱۷۹	۲۲۹	۲۷۹
۳۰	۸۰	۱۳۰	۱۸۰	۲۳۰	۲۸۰
۳۱	۸۱	۱۳۱	۱۸۱	۲۳۱	۲۸۱
۳۲	۸۲	۱۳۲	۱۸۲	۲۳۲	۲۸۲
۳۳	۸۳	۱۳۳	۱۸۳	۲۳۳	۲۸۳
۳۴	۸۴	۱۳۴	۱۸۴	۲۳۴	۲۸۴
۳۵	۸۵	۱۳۵	۱۸۵	۲۳۵	۲۸۵
۳۶	۸۶	۱۳۶	۱۸۶	۲۳۶	۲۸۶
۳۷	۸۷	۱۳۷	۱۸۷	۲۳۷	۲۸۷
۳۸	۸۸	۱۳۸	۱۸۸	۲۳۸	۲۸۸
۳۹	۸۹	۱۳۹	۱۸۹	۲۳۹	۲۸۹
۴۰	۹۰	۱۴۰	۱۹۰	۲۴۰	۲۹۰
۴۱	۹۱	۱۴۱	۱۹۱	۲۴۱	۲۹۱
۴۲	۹۲	۱۴۲	۱۹۲	۲۴۲	۲۹۲
۴۳	۹۳	۱۴۳	۱۹۳	۲۴۳	۲۹۳
۴۴	۹۴	۱۴۴	۱۹۴	۲۴۴	۲۹۴
۴۵	۹۵	۱۴۵	۱۹۵	۲۴۵	۲۹۵
۴۶	۹۶	۱۴۶	۱۹۶	۲۴۶	۲۹۶
۴۷	۹۷	۱۴۷	۱۹۷	۲۴۷	۲۹۷
۴۸	۹۸	۱۴۸	۱۹۸	۲۴۸	۲۹۸
۴۹	۹۹	۱۴۹	۱۹۹	۲۴۹	۲۹۹
۵۰	۱۰۰	۱۵۰	۲۰۰	۲۵۰	۳۰۰